Calciumchlorid

Mode d'emploi

Engrais foliaire riche en calcium contre les taches amères et les carences en calcium

■ Composition
139 g/l Ca ou 384 g/l $CaCl_2$, SL

■ Généralité
Les carences en calcium ou les troubles de l'alimentation en calcium peuvent occasionner des dégâts importants dans les cultures, comme p.ex. les taches amères en arboriculture. Calciumchlorid est un engrais foliaire riche en calcium pour combattre les taches amères, ainsi que d'autres taches foliaires, et pour améliorer l'aptitude au stockage des pommes. Calciumchlorid est très bien toléré et rapidement absorbé par les plantes. Cette formulation permet également une excellente répartition de la bouillie sur le feuillage, les fleurs et les fruits.

■ Emploi
Pulvériser ou nébuliser Calciumchlorid. Traiter tôt le matin, le soir ou par temps couvert. Ne pas traiter pendant de fortes chaleurs (attention à partir de températures > 25 °C). Bien mouiller les fruits. Agiter avant l'emploi.

Arboriculture
8 l/ha (pour un volume de haie de 10'000 m^3/ha).
Risques faibles de taches amères (bonne charge, variétés peu sensibles) : 2-3 applications, 6, 4 et 2 semaines avant la récolte.
Risques élevés de taches amères (charge faible, variétés sensibles comme *Boskoop, Braeburn, Cox, Elstar, Gravensteiner, Jonagold, Maigold, Pomme-Cloche, etc.*) : 4 à 6 applications dès début juillet, tous les 14 jours, au plus tard 2 semaines avant la récolte. Traiter avec 1000 l/ha de bouillie.

Préparation de la bouillie :
Remplir à moitié le pulvérisateur avec de l'eau, enclencher l'agitateur, puis ajouter la quantité nécessaire de Calciumchlorid. En cas de mélange avec des produits phytosanitaires, dissoudre d'abord les produits phytosanitaires, puis ajouter Calciumchlorid. Ajouter l'eau manquante dans la citerne, puis pulvériser la bouillie immédiatement.

■ Miscibilité
Ne pas mélanger Calciumchlorid avec Armicarb, Myco-San et Myco-Sin, des émulsions concentrées (EC) ou des produits alcalins. Respecter un intervalle de 6 jours entre une application d'Armicarb et de Calciumchlorid.

Pour des mélanges avec d'autres produits phytosanitaires, faire un essai de mélange au préalable.

■ Conservation et stockage
Au moins 2 ans dans l'emballage d'origine, au sec, à température ambiante et à l'abri du gel.

■ Indications de risques et conseils de prudence
Symbole de risque : Xi
R36 Irritant pour les yeux.
S2 Conserver hors de la portée des enfants.
S23 Ne pas respirer les aérosols.
S24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.
S46 En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

■ Emballage
10 l

S'il n'est pas utilisé de manière appropriée, ce produit risque de porter atteinte à la fertilité du sol, à l'état des eaux et de l'air et de nuire à la qualité des plantes.
Ne doit pas être appliqué ni dans les réserves naturelles ni dans les roselières et les marais; ni dans les haies, les bosquets et la forêt (y inclus une bande de 3 m de large le long de ces éléments); ni dans les eaux superficielles (y inclus une bande de 3 m de large le long de ces eaux), ainsi que dans la zone S1 (zone de captage) des zones de protection des eaux souterraines.

Détenteur d'homologation:
Schneiter Agro AG, Industrie Birren 30, 5703 Seon

Version 03.2012